

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wat moet u voor, tijdens en na uw behandeling doen?



GEDEON RICHTER



Esmya® 5 mg tabletten

Patiëntenkaart

Esmya kan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Een van de mogelijke bijwerkingen is ernstige schade aan uw lever.

Op deze kaart vindt u informatie over de bloedtesten die tijdens de hele behandeling moeten worden uitgevoerd. Ook wordt er uitgelegd wat u moet doen als u bijwerkingen krijgt die met uw lever te maken hebben.



Gebruik Esmya niet als u leverproblemen heeft. Vertel het uw arts als u weet dat u problemen met uw lever heeft of als u niet zeker weet of uw lever goed werkt.

Regelmatig bloedtesten laten uitvoeren

Voor u begint met elke behandelcyclus, moeten er bloedtesten worden uitgevoerd zodat kan worden gecontroleerd hoe goed uw lever werkt. Op basis van de uitslag van deze testen besluit de arts of de behandeling met Esmya geschikt is voor u.

Tijdens de behandeling met Esmya voert uw arts regelmatig bloedtesten uit om uw leverfunctie te controleren. Deze testen moeten elke maand gebeuren, en ook een paar weken nadat u een behandelcyclus heeft afgemaakt (zie het overzicht hieronder). Uit deze bloedtesten kan de arts opmaken hoe goed uw lever werkt. Deze testen zijn noodzakelijk bij het volgen van uw behandeling.



product name Esmya		labelling number K-28032-1.1		country code NL	design code -	plant code 24029344350	item code 29344350	version v_01	
<div> CMYK</div>		printing technology		font (size [leading]): Helvetica Neue LT W1G (9 pt [10,8 pt])			Studio Mucius Scaevola Kft.		
							date 2018.07.24.		
							made by PÁLMAI Dorottya		
packaging material 60g/m ²	size 148,5 × 210 (±0,5)/52,5 × 88 (±1) mm	technical drawing PIL_RTU_52,5x88_148,5x210_temp /Page01			supervised technical drawing by HORVÁTH Győző.			date 2018.06.20.	

In de tabel hieronder
ziet u wanneer u
bloedtesten heeft:

Tekenen en
verschijnselen
van mogelijke
leverproblemen



	DATUM
1e TEST (vóór het begin van de behandeling)	
Begin van de behandeling	
2e TEST (4 weken na het begin van de behandeling)	
3e TEST (8 weken na het begin van de behandeling)	
4e TEST (12 weken na het begin van de behandeling)	
5e TEST (2-4 weken na het einde van de behandeling met Esmya)	



Stop met de behandeling en neem onmiddellijk contact op met een arts als u een of meerdere van de volgende tekenen of verschijnselen opmerkt:

- vermoeidheid, ernstige moeheid
- gele huid/ogen
- donkere urine
- pijn rechtsboven in de buik
- jeuk
- misselijkheid
- overgeven.

De arts moet uw lever onmiddellijk onderzoeken en besluiten of u kunt doorgaan met de behandeling.

K-28032-1.1



product name Esmya		labelling number K-28032-1.1		country code NL	design code -	plant code 24029344350	item code 29344350	version v_01	
colour 		printing technology		font (size [leading]): Helvetica Neue LT W1G (9 pt [10,8 pt])		Studio Mucius Scaevola Kft.			
						date 2018.07.24.			
						made by PÁLMAI Dorottya			
packaging material 60g/m²	size 148,5 × 210 (±0,5)/52,5 × 88 (±1) mm	technical drawing PIL_RTU_52,5x88_148,5x210_temp /Page02			supervised technical drawing by HORVÁTH Győző.		date 2018.06.20.		